

## 膜翅目：蜜蜂总科

吴 燕 如

(中国科学院动物研究所)

蜜蜂是农作物、牧草、果树及很多经济作物的传粉昆虫。养蜂业的发展给人们创造了蜂蜜、蜂王浆、蜂蜡、蜂毒、蜂胶等蜂产品，同时在传播花粉过程中提高了作物种子或果实的产量。野生蜜蜂种类很多，特别在西藏大力发展农、牧业，提高作物产量时期，研究各类蜜蜂的传粉作用，具有现实意义。下面将本总科在西藏所采种类，列出名录，共计110种。

**1. 扇柄叶舌蜂 *Hylaeus indistincta* Mor.**

分布：西藏（察雅吉塘酉西、江达）；西南。

**2. 小黑叶舌蜂 *Hylaeus difformis* Ev.**

分布：西藏（昌都妥坝、察雅吉塘、芒康、江达）；西南。

**3. 社分舌蜂 *Colletes dudgeonii* Bingh.**

分布：西藏（察雅吉塘、类乌齐、贡觉）。亚洲。

**4. 褐胸分舌蜂 *Colletes sanctus* Ckll.**

分布：西藏（措美、当雄羊八井、吉隆、昂仁、仲巴、普兰科加）；西南。

采访植物：紫云英，狼毒。

**5. 西藏地蜂 *Andrena tibetensis* Wu**

分布：西藏（察雅吉塘酉西）。

**6. 绯地蜂 *Andrena ferghanica* Mor.**

分布：西藏（聂拉木、樟木）。

采访植物：唇形科。

**7. 甘肃地蜂 *Andrena kansuensis* Alfk.**

分布：西藏（察雅吉塘）；西北。

**8. 盖地蜂 *Andrena opercula* Wu**

分布：西藏（芒康）。

**9. 拟盖地蜂 *Andrena subopercula* Wu**

分布：西藏（江达）。

10. 芒康地蜂 *Andrena mangkamensis* Wu  
分布：西藏（芒康）。
11. 喜马拉雅地蜂 *Andrena himalayaensis* Wu  
分布：西藏（聂拉木、聂拉木曲乡）。
12. 灰地蜂 *Andrena cineraria* L.  
分布：西藏（贡觉、江达、八宿然乌、普兰科加）、西北，欧洲，北非。
13. 拟灰地蜂 *Andrena pseudocineraria* Wu  
分布：西藏（察隅）。
14. 曲松地蜂 *Andrena pusumensis* Wu  
分布：西藏（曲松）。
15. 小地蜂 *Andrena parvula* Kby.  
分布：西藏（察雅吉塘、江达）、东北、华北、华中；欧洲。  
采访植物：伞形科。
16. 高山地蜂 *Andrena montana* Wu  
分布：西藏（察雅吉塘酉西）。  
采访植物：菊科。
17. 拟高山地蜂 *Andrena submontana* Wu  
分布：西藏（八宿然乌错、贡觉、类乌齐）。  
采访植物：唇形科。
18. 黑地蜂 *Andrena nigra* Wu  
分布：西藏（吉隆）。  
采访植物：油菜。
19. 金刷地蜂 *Andrena rufifrons* Nyf.  
分布：西藏（聂拉木）；欧洲。
20. 白唇地蜂 *Andrena albopicta* Rad.  
分布：西藏（类乌齐、察雅吉塘、昌都妥坝）。
21. 瘤唇地蜂 *Andrena sublisterelle* Wu  
分布：西藏（八宿然乌错、察隅桑久、类乌齐）。  
采访植物：油菜。
22. 察雅地蜂 *Andrena chagyabensis* Wu  
分布：西藏（察雅吉塘）。
23. 脊颊地蜂 *Andrena carinigena* Wu  
分布：西藏（察雅吉塘、芒康阿东）。
24. 宽颊地蜂 *Andrena latigena* Wu  
分布：西藏（吉隆）。
25. 白带地蜂 *Andrena albofasciata* Thoms.  
分布：西藏（江达、吉隆县吉隆区）、西北；欧洲。  
采访植物：紫云英。

**26. 厚地蜂 *Andrena convexiuscula* Kby.**

分布：西藏（察雅吉塘酉西），亚洲西部，欧洲。

采访植物：油菜。

**27. 联地蜂 *Andrena combinata* Christ.**

分布：西藏（扎达底雅马阳）。

采访植物：伞形科。

**28. 水苏地蜂 *Andrena betoni* Ckll.**

分布：西藏（亚东阿桑村、吉隆县吉隆区）。

采访植物：菊科，百合科。

**29. 黑伞地蜂 *Andrena mediocalens* Ckll.**

分布：西藏（察隅热拉格越曲朱拉、察隅洞冲、察隅阿扎）。

采访植物：毛茛科。

**30. 拟黑伞地蜂 *Andrena submediocalens* Wu**

分布：西藏（亚东阿桑村）。

采访植物：蔷薇科。

**31. 粗腿拟隧蜂 *Halictoides latifemurinus* Wu**

分布：西藏（芒康）、西北、西南。

**32. 山拟隧蜂 *Halictoides montanus* Mor.**

分布：西藏（芒康、察雅吉塘）、西南、西北。

**33. 扁胫拟隧蜂 *Halictoides subclavicus* Wu**

分布：西藏（聂拉木）。

**34. 宽颚拟隧蜂 *Halictoides megamandibularis* Wu**

分布：西藏（芒康、察雅、江达）、西南。

**35. 马踢刺拟隧蜂 *Halictoides calcaratus* Mor.**

分布：西藏（聂拉木）、内蒙。

**36. 中华拟隧蜂 *Halictoides sinensis* Wu**

分布：西藏（昌都）、西南。

**37. 长角拟隧蜂 *Halictoides longicornis* Wu**

分布：西藏（日喀则、南木林、拉孜温泉、仁布沙达、吉隆宗咯、乃东）。

**38. 毛胫拟隧蜂 *Halictoides pilotibialis* Wu**

雄体长7—8毫米，雌7毫米。近似扁胫拟隧蜂，主要区别为：雄触角细长，长达后胸，下表面正常；中足胫节端部仅具一个刺状突起，非三个；后足胫节端部宽大；第6—8节腹板及生殖节均不同。雌唇基刻点大而稀，非细而密；后足胫节外侧基部被少量褐色毛，非全部灰白色毛。

分布：西藏（吉隆县吉隆区）。

**39. 长距拟隧蜂 *Halictoides longispurinis* Wu**

雌体长10毫米。体黑色，头部、胸部及腹部均具蓝色光泽。唇基光滑刻点大而分散，两侧缘较密，前缘较小而密；中胸背板刻点密，中央较稀，并胸腹节中央小区与小

盾片等长，腹部各背板刻点小而密，1—5节背板端缘光滑；中足胫距长，为基跗节的三分之二长，顶端弯而尖，中部较宽，梯状；后足胫距短粗。体毛较密，灰白色；头部各部被直立的黑毛；腹部6—7节背板毛黄褐色；后足胫节被白毛，外侧基部黑褐色。

分布：西藏（樟木）。

40. 三齿拟隧蜂 *Halictoides tridentatus* Wu

雌体长7—9毫米。上颚三项齿；唇基光滑，中部具数个大刻点，两侧较密；侧单眼至颅顶边缘与侧单眼至复眼的距离为3:5；颊宽于复眼最宽处；中胸背板刻点密；并胸腹节中央小区具细纵皱纹；腹部背板刻点稀且大，端缘光滑。体毛较长而密，大部分为白色毛，唇基被稀而长的黑毛；颜面及颅顶被黑毛杂少量白毛；中胸背板四周灰黄色毛，杂少量黑毛。

分布：西藏（仁布沙达、拉孜温泉、吉隆县吉隆区）。

41. 山杓蜂 *panurginus montanus* Gir.

分布：西藏（昌都妥坝、江达、察雅吉塘酉酉）。

42. 棕翅彩带蜂 *Nomia fuscipennis* Sm.

分布：西藏（墨脱）、华南、西南。

43. 齿彩带蜂 *Nomia punctulata* Westw.

分布：西藏（芒康）、东北、西北、华东、华中、华南、西南；亚洲。

44. 白绒淡脉隧蜂 *Lasioglossum proximatus* Sm.

分布：西藏（泽当、曲水、乃东昌珠、日喀则）；亚洲。

45. 宽带淡脉隧蜂甘肃亚种 *Lasioglossum zonulus kansuensis* Blüthg.

分布：西藏（昌都、察雅吉塘、芒康）、西北。

46. 尖肩淡脉隧蜂 *Lasioglossum subopacus* Sm.

分布：西藏（墨脱）、国内广布；亚洲。

采访植物：油菜。

47. 闪翅淡脉隧蜂 *Lasioglossum lucidipennis* Sm.

分布：西藏（芒康、江达、措美、泽当）。亚洲。

48. 小淡脉隧蜂 *Lasioglossum morio* Fabr.

分布：西藏（日喀则）。欧洲。

采访植物：油菜。

49. 淡翅红腹蜂 *Sphecodes grahami* Ckll.

分布：西藏（察隅）、东北、华北、华东、华南、西南。

50. 西藏准蜂 *Melitta tibetensis* Wu

分布：西藏（拉孜、贡觉、类乌齐、曲水、日喀则、仲巴、吉隆、拉孜、萨迦、南木林艾马）。

采访植物：紫云英。

51. 拟西藏准蜂 *Melitta pseudotibetensis* Wu

分布：西藏（亚东、日喀则、拉孜、吉隆、昂仁、仲巴、拉萨、萨迦）。

52. 樟木准蜂 *Melitta changmuensis* Wu

雄体长10—11毫米。体色黑，腹部1—5节背板端缘具白毛带。唇基端部被大而稀的

刻点，基部较密，端缘光滑；颚腺距长宽相等；胸部背板刻点小而密，并胸腹节中央小区革状；腹部背板刻点大而浅；前足及中足胫节端部外侧具针状突起；腹部第8节腹板侧缘近端部具骨质化的宽齿状突起，完全不同于西藏准蜂。体被灰黄色毛，唇基及颜面密被浅黄色长毛，复眼内侧及额顶被少量黑褐色毛；胸侧及并胸腹节密被淡黄色长毛；中胸背板杂有少量黑褐色长毛；跗节内侧毛金黄色；腹部3—6节背板被短的黑毛。

分布：西藏（樟木）。

53. 黑毛刷切叶蜂 *Megachile nigroscopula* Wu

分布：西藏（昌都妥坝、江达）。

采访植物：紫云英。

54. 丽切叶蜂 *Megachile habropodooides* Meade-Waldo

分布：西藏（察雅吉塘、八宿然乌错、浪卡子、乃东亚堆扎拉北、亚东帕里、定日绒布寺、聂拉木色龙）；西北，亚洲。

采访植物：紫云英。

55. 拟小突切叶蜂 *Megachile disjunctiformis* Ckll.

分布：西藏（聂拉木立新乡）、几遍全国；亚洲。

56. 萨切叶蜂 *Megachile sauteri* Hedicke

分布：西藏（察隅），台湾。

采访植物：紫云英。

57. 黄带切叶蜂 *Megachile flavofasciata* Wu

分布：西藏（扎耶）。

58. 拉达切叶蜂 *Megachile ladacensis* Ckll.

分布：西藏（扎达曲松、聂拉木甲曲）；亚洲（克什米尔地区）。

59. 拟拉达切叶蜂 *Megachile rupshuensis* Ckll.

分布：西藏（普兰巴噶康萨、吉隆）；亚洲（克什米尔地区）。

采访植物：紫云英。

60. 蒙古切叶蜂 *Megachile mongolica* Mor.

分布：西藏（江达）、蒙古。

采访植物：紫云英。

61. 木巢切叶蜂 *Megachile ligniseca* Kby.

分布：西藏（察雅吉塘）；欧洲。

62. 长毛切叶蜂 *Megachile dolichotricha* Ckll.

分布：西藏（贡觉、江达、芒康荣喜、类乌齐）。

63. 西藏切叶蜂 *Megachile xizangensis* Wu

分布：西藏（当雄羊八井、日喀则、聂拉木、亚东帕里、阿桑村、察雅吉塘、吉隆、芒康）、西北。

采访植物：紫云英。

64. 小足切叶蜂西藏亚种 *Megachile lagopoda tibetana* Hedicke

分布：西藏（扎达底雅什布奇）；西南。

65. 圆切叶蜂 *Megachile circumcincta* Kby. 分布：西藏（察雅吉塘、昌都妥坝）、华北、西北，欧洲。
66. 条切叶蜂 *Megachile faceta* Bingham 分布：西藏（芒康）。
67. 沟脊孔蜂 *Heriades concavus* Wu 分布：西藏（察雅吉塘）。
68. 黑刷裂爪蜂 *Osmia nigroscopula* (Wu) 分布：西藏（察雅吉塘）。
69. 西藏裂爪蜂 *Osmia xizangensis* (Wu) 分布：西藏（芒康）。
70. 大戎蜂 *Hoplitis princeps* Mor. 分布：西藏（日土热邦）、西北，亚洲（中亚），欧洲东南。
71. 黄带尖腹蜂 *Coelioxys rufescens* Lep. 分布：西藏（噶尔索卖）、西北、华北、华东、西南。
72. 红带尖腹蜂 *Coelioxys ruficincta* Ckll. 分布：西藏（察隅）、华北、华东。
73. 方颚尖腹蜂 *Coelioxys mandibularis* Nyl. 分布：西藏（聂拉木）、华北，欧洲。
74. 长尖腹蜂 *Coelioxys elongata* Lep. 分布：西藏（察雅吉塘）、西北、华北，欧洲，北非。
75. 赤腹蜂 *Parevaspis abdominalis* Sm. 分布：西藏（墨脱马尼翁），印度尼西亚。
76. 红跗黄斑蜂 *Anthidium philorm* Ckll. 分布：西藏（吉隆、拉孜、措美哲古）、西南。  
采访植物：紫云英。
77. 点黄斑蜂喜马拉雅亚种 *Anthidium punctatum himalayaensis* Wu 分布：西藏（察雅吉塘）。
78. 扎达黄斑蜂 *Anthidium zadaensis* Wu 分布：西藏（扎达底雅马阳）。
79. 黑腹黄斑蜂 *Anthidium nigroventralis* Wu 分布：西藏（普兰）。
80. 黄跗黄斑蜂 *Anthidium flavotarsum* Wu 分布：西藏（江达）。
81. 中华花条蜂 *Anthomegilla sinensis* Wu 分布：西藏（普兰巴噶、普兰老孤山口南、巴噶康萨、霍尔、日土热邦扎布、扎达曲松、香孜、香巴、当雄羊八井、昌都妥坝、察雅吉塘、吉隆宗嘎、吉隆县吉隆区）。
82. 黄黑花条蜂 *Anthomegilla flavonigra* Wu 雄体长12毫米。体黑色，胸部及腹部1—2节背板密被黄褐色长毛，腹部3—6节背板

被黑毛。唇基中部及两侧刻点较密，中部稀；端缘刻点密；颚眼距长度小于宽度；触角第1鞭节等于 $2+3+4$ 节的和；第2鞭节后的各节表面具半圆形的粗糙压平区，各节等长，末节稍长；前足末跗节膨大；中足胫距约为基跗节长的一半。头部被灰白色长毛，颜侧杂有黑毛；胸侧、腹部1—3节腹板端缘及足均被白毛；中足胫节及跗节内侧、后足胫节及跗节均被黄褐色毛，后足胫节毛最长。

分布：西藏（康马）。

**83.西藏花条蜂 *Anthomegilla tibetensis* Wu**

雄体长11毫米。体黑色，胸部及腹部1—2节背板密被红褐色长毛，3—7节背板被黑毛。头黑色，唇基（侧缘黑纹），额唇基区横的斑、颜侧（触角窝以下）、上唇（中部两侧黑褐色圆斑）、触角柄节前表面均浅黄色。各足2—5跗节褐色；翅基片红褐色。上唇宽为长的两倍，刻点粗大，浅而稀；唇基光滑，刻点粗大而稀；颚眼距宽度稍大于长度；触角第1鞭节短于 $4+5+6$ 节的和，但长于 $4+5$ 的和；第2—10鞭节表面均具半圆形粗糙的压平区；第12节扁平，表面具凹陷；前足末跗节膨大，后足胫距为基跗节长的一半；腹部6—8节腹板及生殖节不同于中华花条蜂。头部被白毛，颜侧杂少量黑褐色毛；足被白毛。

分布：西藏（吉隆宗哦）。

**84.褐胸条蜂 *Anthomegilla orophila* (Ckll.)**

分布：西藏（聂拉木、扎达、乃东、日喀则、普兰、康马、萨迦）；亚洲（金锡）。

**85.拟褐胸条蜂 *Anthomegilla pseudorophila* (Wu)**

分布：西藏（定日西绒布）。

**86.丽条蜂喜马拉雅亚种 *Anthophora pulcherrima himalayaensis* Wu**

分布：西藏（聂拉木、昌都、芒康、类乌齐、拉萨、当雄羊八井、江孜、康马、亚东、日喀则、吉隆、仲巴、江达、扎达、林芝、拉孜、萨迦）。

**87.拟丽条蜂 *Anthophora khambana* Ckll.**

分布：西藏（日喀则、康马、拉孜、昂仁、吉隆、仲巴、普兰、萨迦）。

采访植物：紫云英。

**88.墨条蜂黑足亚种 *Anthophora parientina schenckii* D.T.**

分布：西藏（类乌齐、左贡、当雄羊八井、康马、聂拉木、吉隆、仲巴、拉孜、亚东、定结）、西北、欧洲。

**89.灰胸条蜂 *Anthophora cinerithoracis* Wu**

分布：西藏（吉隆）。

**90.芒康条蜂 *Anthophora mangkamensis* Wu**

分布：西藏（芒康）。

采访植物：毛茛科。

**91.堆条蜂绒毛亚种 *Anthophora acervorum villosula* Sm.**

分布：西藏（昌都、昂仁、日土、康马、定结、谢通门）、华中、西南。

**92.刺跗条蜂 *Anthophora spinitarsis* Wu**

分布：西藏（日喀则、乃东、曲水）。

93. 钝齿条蜂 *Anthophora obtusispina* Wu  
分布：西藏（扎达）。
94. 狐条蜂 *Anthophora vulpina* Pz.  
分布：西藏（噶尔索卖、日土、扎达）；欧洲，北非。
95. 狐条蜂西藏亚种 *Anthophora vulpina waltoni* Ckll.  
分布：西藏（昌都、芒康、贡觉、察雅吉塘、波密、林周、曲水、泽当、当雄羊八井、亚东、康马、拉孜、萨迦、定日、吉隆、仲巴、普兰、扎达。）  
采访植物：紫云英
96. 刺泽条蜂 *Heliophila unispina* Wu  
分布：西藏（吉隆）。
97. 顶矮面蜂 *Clisodon terminalis* Cress.  
分布：西藏（亚东）、东北。
98. 叉矮面蜂高加索亚种 *Clisodon furcatus caucasicus* Fr.  
分布：西藏（昌都妥坝、波密）、东北、华北、西北。  
采访植物：毛茛科。
99. 中华矮面蜂 *Clisodon sinensis* Wu  
分布：西藏（吉隆）。
100. 台湾回条蜂 *Habropoda tainanicola* Strand  
分布：西藏（墨脱）、华东、西南。
101. 西藏回条蜂 *Habropoda xizangensis* Wu  
分布：西藏（吉隆）。
102. 黄胸木蜂 *Xylocopa appendiculata* Sm.  
分布：西藏（芒康）、除西北外几遍全国；亚洲。
103. 孔木蜂 *Xylocopa perforator* Sm.  
分布：西藏（墨脱），印度尼西亚。
104. 紫木蜂 *Xylocopa valga* Gerst.  
分布：西藏（扎达）、西北，旧北区西南部。
105. 领木蜂 *Xylocopa collaris* Lep.  
分布：西藏（墨脱）、华南、西南；印度尼西亚，马来亚。
106. 尖足木蜂 *Xylocopa acutipennis* Sm.  
分布：西藏（墨脱）、西南。
107. 甘孜艳斑蜂 *Nomada gyangzensis* Ckll.  
分布：西藏（拉孜）、西南。
108. 西藏绒斑蜂 *Epeorus tibetensis* Meade-Waldo  
分布：西藏（察雅）、西南。
109. 大排蜂 *Megapis laboriosa* Sm.  
分布：西藏（察隅、波密、墨脱、错那、聂拉木、亚东、樟木、吉隆）、西南。  
采访植物：麻醉木，忍冬科。

110. 中华蜜蜂 *Apis cerana* Fabr.

分布：西藏（察隅、波密、聂拉木、昌都）、除西北外全国分布；亚洲。

**HYMENOPTERA: APOIDEA**

Wu Yan-ru

(*Institute of Zoology, Academia Sinica*)

The present paper deals with 62 genera and 110 species of Apoidea of Xizang.